

Žádanka na monitorování hladin léčiv

Klinický farmaceut Mgr. Zuzana Vašířová, kontakt: 312 606 547

Kód ZP		IČP		Odbornost	
Číslo pojištěnce				Pacient (příjmení, jméno, titul)	
			X		
Základní dg.		Ostatní dg.		Sex	
				Váha (kg)	
				Výška (cm)	
Oddělení (stanice)		Lékař (razítko, podpis)		Telefon	STATIM
				Odběr provedl	Vzorek zkontroloval
Důvod vyšetření:			Laboratorní hodnoty:		
	První vyšetření		Kreatinin (μmol/l)		
	Opakované vyšetření				
Lék:			Způsob aplikace		
	Gentamicin		infuze – délka hodin		
	Vankomycin		i. m.		
	Amikacin		i. v.		
			p.o.		
Datum odběru vzorku					
Odběr vzorku před podáním léku v hodin					
Lék podán v (u infuze začátek podání) hodin					
Odběr vzorku po podání léku v hodin					
Dávkový režim					
Datum	Čas podání	Pořadí dávky	Dávka (mg)	Interval (hodiny)	
Další léčba pacienta, etiologické agens, poznámky:					



Klinická laboratoř

Vančurova 1548, 272 59 Kladno

Oblastní nemocnice Kladno, a.s.
Vančurova 1548, 272 59 Kladno
IČO: 27256537

Klinická laboratoř

Biochemická laboratoř tel: 312 606 246

**Odběr biologického materiálu na stanovení koncentrace antibiotik
– manuál pro zdravotnické pracovníky**

Amikacin (AMIKACIN Fresenius Kabi 5mg/ml 100ml, B-Braun 10mg/ml 100ml) Gentamicin (GENTAMICIN LEK 80mg/2 ml inj.sol., B-Braun 1mg/ml = 80mg/80ml, 3mg/ml = 240mg/80ml)		
Odběrová zkumavka	zkumavka Sarstedt, hnědý uzávěr	
Odběr	Ustálený stav	doporučujeme provést odběr dle režimu podávání: - frakcionované (denní dávka rozdělena do více dávek) - odběr 1. – 2. den (3. dávka) - jednou denně (denní dávka v jedné dávce) – odběr již 2. den
	Místo odběru	periferní žíla (z jiného místa, než bylo antibiotikum aplikováno)
	Před podáním dávky	0 – 30 minut
	Po podání dávky	30 minut po ukončení infuze 1 hodinu po podání i. m.
	Hemodialýza	3 odběry – před HD, po HD a po podání antibiotika
Podmínky přepravy	ihned po odběru doručit na centrální příjem Klinické laboratoře spolu s vyplněnou <i>žádankou na klinicko-farmakologické vyšetření při léčbě antibiotiky</i>	

Vankomycin (VANCOMYCIN 500mg inf. plv., 1000mg inf. plv.)		
Odběrová zkumavka	zkumavka Sarstedt, hnědý uzávěr	
Odběr	Ustálený stav	doporučujeme provést odběr po 4. dávce při režimu s nasycovací dávkou lze provést odběr po 2. dávce
	Místo odběru	periferní žíla (z jiného místa, než bylo antibiotikum aplikováno)
	Před podáním dávky	0 – 30 minut
	Po podání dávky	30 minut po ukončení infuze
	Hemodialýza	3 odběry – před HD, po HD a po podání antibiotika
Podmínky přepravy	ihned po odběru doručit na centrální příjem Klinické laboratoře spolu s vyplněnou <i>žádankou na klinicko-farmakologické vyšetření při léčbě antibiotiky</i>	

Kontakty:

Klinický farmaceut: Mgr. Zuzana Vašířová, tel: 312 606 547

Klinická laboratoř: Ing. Luděk Šprongl, tel. 312 606 325

Mgr. Lucie Poláková, tel. 312 606 581